

Data de sembra en pèsol proteaginós

Una elecció adequada de la data de sembra és un factor determinant per l'èxit en la producció del pèsol. Aquesta ve determinada principalment per dos factors: la zona agroclimàtica (freda, temperada o càlida) i la resistència de les varietats al fred (tipus hivernal o primavera).

A les zones fredes i temperades, en sembres primerenques (octubre i novembre), es recomana la sembra de varietats hivernals, que mostren una major resistència al fred. Si en aquestes sembres precoces s'utilitzen varietats de pèsol de primavera el risc per danys de fred i de patir atacs de bacteriosis és molt major. Varietats hivernals: AVIRON, BALLTRAP, CARTOUCHE, COMANCHE, CURLING, ENDURO, FRESNEL, GANGSTER, INDIANA i ISARD.

A les zones càlides i en sembres tardanes, a les zones temperades i fredes, es recomana sembrar varietats de primavera o de cycle curt que tenen una maduració més ràpida i s'escapen amb més facilitat de les temperatures més elevades del final del cycle. Varietats de primavera: ASTRONAUTE, AUDIT, KAYANNE, MOWGLI, MYTHIC i NAVARRO.

A la Taula 1 es mostren les dates de sembra per a cada zona agroclimàtica i tipus de pèsol.




Figura 1. Agrupació de les zones de conreu en funció del règim tèrmic.

	OCTUBRE				NOVEMBRE				DESEMBRE				GENER				FEBRER			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ZONES FREDES																				
ZONES TEMPERADES																				
ZONES CÀLIDES																				

■ Varietats hivernals ■ Varietats primavera

Taula 1. Data de sembra de les varietats de pèsol proteaginós hivernals i de primavera, en funció de la zona agroclimàtica.

Autors:

JOAN FAÑÉ.
JOAN SERRA.
ROSER SAYERAS.

joan.fane@irta.cat. IRTA Mas Badia
joan.serra@irta.cat. IRTA Mas Badia
rosier.sayeras@irta.cat. IRTA Mas Badia