


Taula d'identificació de les principals erugues del blat de moro

març 27, 2025 |

Aquesta taula serveix com a guia ràpida per a la identificació i gestió de les erugues del panís. És recomanable combinar diferents estratègies de control per minimitzar l'impacte sobre el cultiu i el medi ambient.

Nom científic	Color i forma cap	Color cos (tòrax i abdomen)	Mida eruga desenvolupada	Part planta on s'alimenten	Altres	Imatges (mida de la foto a escala real)
<i>Ostrinia nubilalis</i>		Gris-marro amb taques circulars marcades als costats de cada segment	2cm	S'alimenta de la tija (especialment la part superior), nusos i entrenusos. També pot afectar la panotxa a la tardor.	Poques vegades es troben a la planta.	
<i>Sesamia nonagrioides</i>	Negre-marro brillant i amb forma de cor	Rosat uniforme, sense taques	3cm	S'alimenta de la tija, des de la inserció de la panotxa fins al coll. A la tardor pot afectar la base de la canya. A vegades ataca la panotxa.	Mal es troben a l'exterior a la planta. Si es troben moltes larves rosades juntes a la tija, probablement siguin Sesamia.	
Nom científic	Color i forma cap	Color cos (tòrax i abdomen)	Mida eruga desenvolupada	Part planta on s'alimenten	Altres	Imatges (mida de la foto a escala real)
<i>Helicoverpa armigera</i> (<i>Heliothis</i>)		Ratilles grogues ben definides als costats. Color variable, de marro-negre a verd clar.	3cm	S'alimenta de les barbes de la panotxa, de les panotxes tendres i, ocasionalment, de les fulles. És visible durant el dia.	Els últims segments del cos tenen un angle truncat (semblen tallats sobtadament).	
<i>Achthya (Pseudaleia) unipuncta</i>	Colors clar: marro, groc o taronja. Forma més quadrangular	Franges longitudinalment de color variable (marro a verd). Aspecte fosc.	3cm	S'alimenta principalment de les fulles. Quan hi ha atacs forts, es veuen clarament les fulles devorades pel marge.	Larves amagades en les fulles tendres en forma de con durant el dia. Només visibles en atacs importants.	

Recomanacions per al control

- Monitoratge: Inspeccionar les plantes regularment per detectar la presència de larves i danys.
- Mètodes biològics: Potenciar l'activitat de depredadors naturals com les vespes parasitoides.
- Mètodes culturals: Rotació de cultius i eliminació de residus de collita per reduir les poblacions hivernants.
- Control químic: Ús de productes fitosanitaris autoritzats, seguint les recomanacions tècniques i les normatives vigents.

Aquest document serveix com a guia ràpida per a la identificació i gestió de les erugues del

panís. És recomanable combinar diferents estratègies de control per minimitzar l'impacte sobre el cultiu i el medi ambient.

AUTORS

MATILDE EIZAQUIRRE
UdL

CARMEN LOPEZ
UdL

UNITAT DE SANITAT VEGETAL

.