

Les fortes ventades del 28 de juliol provoquen danys en alguns cultius





jul. 30, 2025 |

El passat dilluns 28 de juliol va tenir lloc un episodi de fortes ventades de component nord principalment a la part situada més al nord-est del país. Tot i que es tracta d'una zona avesada a la forta tramuntana les ràfegues de vent van ser en algun moment intenses i van arribar a malmetre alguns cultius.



Tot i que la distribució de les afectacions causades per aquests fenòmens acostuma a ser aleatòria, la majoria d'estacions de la zona, segons les dades del Meteocat, van registrar ratxes màximes de vent superiors als 50, 60 o fins i tot 70 km/h en algun moment del dia. Durant el migdia va ser quan es van registrar els pics d'intensitat.

S'han recollit dades de les estacions de la Tallada d'Empordà, Banyoles, La Bisbal d'Empordà i Sant Pere Pescador. En el cas de l'estació de la Tallada cal tenir en compte que els registres són a 2 metres d'alçada, mentre que a la resta d'estacions són a 10 metres. Les dades VVX fan referència a les ratxes màximes de vent en aquella franja horària.



Com es pot comprovar en tots els casos els valors recollits a les hores centrals del dia assolixen sobradament ratxes superiors als 50 km/h. En casos com a la Bisbal o Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, aquestes ratxes superen fàcilment els 70 km/h i es mantenen bona part del dia per sobre els 50 km/h. A l'estació de Banyoles durant les hores centrals també es van registrar fortes ratxes en algun moment, superant els 60 km/h.

Des de IRTA, es realitzen assajos de varietats de blat de moro, on s'han detectat el trencament d'algunes canyes. S'ha observat una diferència d'afectació del vent, segons les varietats cultivades. De les varietats de blat de moro analitzades, les varietats amb major grau d'afectació han estat KWS POSEIDO, KWS RIVALDO YG, KWS FRANCISCO YG, LG31688, SY ULTIMATE i P1921, entre d'altres. De mitjana, la varietat més afectada arriba al 68.75% de canyes trencades. De les diferents varietats, algunes parcel·les superen el 80% d'afectació.

Es possible que en alguns punts del territori on s'hagin donat aquestes ventades s'observin situacions similars en alguns camps de blat de moro.





AUTORS

AINA PERICH

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

JOAN SERRA

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

ROSER SAYERAS

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

MARC JABARDO

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles

MARIA BOIX

IRTA – Programa de Cultius Extensius
Sostenibles