

Residus de l'herbicida prosulfocarb: Aspectes a tenir en compte per a reduir el risc de contaminació

oct. 28, 2026 | [Actualitat](#) [Bones pràctiques](#) [Males herbes](#)

Quin és el problema?

Durant la campanya 2025-2026 s'ha produït un augment de les deteccions de residus de l'herbicida prosulfocarb en mostres d'oli d'oliva, especialment en zones on conviuen cereals d'hivern i olivera.

Aquestes deteccions comporten depreciacions comercials de l'oli i en poden arribar a limitar la comercialització.

A més, la retirada del flufenacet com a alternativa per al control del margall en cereals d'hivern fa preveure un increment de l'ús del prosulfocarb durant la campanya 2026-2027.

Per què es produeix la contaminació?

El prosulfocarb és un herbicida eficaç per al control del margall en cereals, però presenta característiques que poden afavorir el seu desplaçament fora de la parcel·la tractada:

- **Volatilitat:** pot passar a l'atmosfera després de l'aplicació i ser transportat fora de la parcel·la
- Possibilitat de deriva durant l'aplicació.
- Forta afinitat pels greixos i altres lípids (lipòfil)
- Capacitat de contaminar cultius sensibles situats a l'entorn com l'olivera.

Com podem reduir el risc?

Abans de tractar

- Eviteu tractar parcel·les properes a oliveres que encara estiguin pendents de recol·lecció.

- Sempre que sigui possible, valoreu retardar la sembra o el tractament fins després de la collita de les olives.

Durant l'aplicació

- Utilitzeu broquets de reducció de deriva del 90% o superior.
- Mantingueu la barra de polvorització baixa (aproximadament 50 cm sobre l'objectiu) sempre que sigui compatible amb l'equip i el tipus de broquet.
- No supereu els 8 km/h de velocitat d'avanç.
- Eviteu volums de brou inferiors a 120 L/ha.

Condicions meteorològiques recomanades

- Temperatura inferior a 20 °C.
- Humitat relativa superior al 50%.
- Vent inferior a 10 km/h.
- No apliqueu si el vent es dirigeix cap a oliveres o altres zones sensibles.
- Eviteu les hores centrals del dia i les situacions d'inversió tèrmica.

Quines poden ser les conseqüències?

Si continuen apareixent mostres d'oli contaminades, es podrien establir restriccions d'ús similars a les aplicades en altres territoris com Aragó, Navarra o França, amb limitacions de dates d'aplicació, dosis o distàncies de seguretat.

És responsabilitat de tothom utilitzar el producte correctament per reduir el risc de contaminació i preservar una eina clau per al control del margall en els cereals extensius a Catalunya.

AUTORS

JOSEP M^a LLENES

Unitat de Malherbologia. Servei de Sanitat Vegetal