

Aplicació de dejeccions líquides en cobertora dels cultius extensius

abr. 15, 2019 |

Aplicar dejeccions líquides en cobertora permet augmentar l'eficiència en la utilització dels nutrients - principalment el nitrogen - que aporten. S'ha editat una guia on es fa referència als punts clau per l'aplicació de dejeccions líquides en aquest moment: la dosificació, el moment òptim d'aplicació, les raons agronòmiques i els equips i maquinària que cal utilitzar.

Les dejeccions ramaderes líquides són:

- Purins
- Fraccions líquides de purins
- Digerits de plantes de biogàs
- etc.

Les **aplicacions en cobertora** d'aquestes dejeccions:

- **Aporten els nutrients, principalment el nitrogen, quan és més necessari pel cultiu i aquest el pot aprofitar millor.**
- **Aporten nitrogen amoniacal, que serà disponible pel cultiu en un termini molt curt.**
- **Permeten augmentar la qualitat de la producció.**
- **S'han de fer en el moment que el pas de maquinària provoqui el menor dany possible, adaptant-lo a cada cultiu.**
- **Han d'aportar, en general, menys de 100 kg N/ha.**

A més, les dejeccions ramaderes líquides s'han d'aplicar amb equips que:

- Permetin conèixer el contingut en nutrients de les dejeccions
- Realitzin aplicacions uniformes en el conjunt de la parcel·la
- Redueixin la volatilització d'amoníac

- Permetin aplicar dosis baixes de dejeccions

S'ha editat una guia sobre *l'Aplicació de dejeccions líquides en cobertora dels cultius extensius* que detalla i amplia aquests aspectes.

Guia aplicació de dejeccions en cobertora

[Publish at Calameo](#)