

Aspectes d'interès en el control de males herbes en postemergència de la colza

set. 28, 2021 |

Les aplicacions en postemergència de la colza resulten interessants per a controlar les males herbes que s'hagin pogut escapar al tractament en preemergència o bé poden ser utilitzades com a única opció de control en parcel·les on s'ha fet una gestió integrada de les males herbes i se sap que hi ha una baixa presència d'aquestes i es preveu poca presència de renadiu.

Les aplicacions en postemergència de la colza resulten interessants com a repàs per a controlar les males herbes que s'hagin pogut escapar al tractament en preemergència o bé poden ser utilitzades com a única opció de control en parcel·les on s'ha fet una gestió integrada de les males herbes i se sap que hi ha una baixa presència d'aquestes.

Les aplicacions en postemergència permeten raonar millor el tractament en funció de la flora present a la parcel·la. A la vegada el productes disponibles són menys dependents de la humitat i matèria orgànica del sòl el que permet obtenir més bons controls en cas de condicions seques on els herbicides de preemergència poden haver tingut problemes.

Molts dels herbicides aplicats en preemergència del cultiu poden ésser aplicats en postemergència primerenca de la colza.

Pel que fa al control de gramínies cal tenir en compte que alguns dels herbicides antigramínics més utilitzats (FOPS i DIMS) poden presentar eficàcies baixes a causa de la presència de biotips de margall resistents. És important aplicar-los en les millors condicions possibles, humitat suficient (> 65%), absència de vent i temperatures ni molt baixes ni molt altes (entre 8-25°C)

Aplicacions a dosis elevades dels antigraminis (DIMS), en colza en condicions d'estress o aplicacions tardanes a partir de les 8 fulles poden donar lloc a fitotoxicitats en colza

Contràriament, també cal tenir en compte que alguna matèria activa com la propizamida necessita de temperatures baixes per a no ser degradada i preservar el màxim de temps

Malgrat tractar-se d'un cultiu de fulla ampla on el control de males herbes del mateix tipus és més complicat, darrerament hi ha disponibles herbicides que permeten obtenir un control acceptable d'aquestes.

Si el camp no està molt afectat de males herbes es pot pensar en controlar-les sense herbicides. En aquest cas és molt important haver conreat des de la collita anterior de manera que s'hagi promogut la seva emergència amb treball superficial de el terreny així poder destruir-les després amb mitjans mecànics.

A partir de les 3 fulles de la colza també és possible fer una passada amb una binadora si la separació entre files és suficient.

[illegible]

JOSEP M^a LLENES
Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i
Cobertura Vegetal

JOSEP M^a MONTULL
Departament d'Hortofructicultura Botànica i
Jardineria UdL

ANDREU TABERNER