



Generalitat de Catalunya
 Departament d'Agricultura, Ramaderia,
 Pesca, Alimentació i Medi Natural
 Servei de Sanitat Vegetal
 Unitat de Bones pràctiques fitosanitàries
 i cobertura vegetal

HERBICIDES I ALTRES MÈTODES DE CONTROL QUE ES PODEN UTILITZAR EN BLAT DE MORO - MARÇ 2016

Composició	Formulació	Grup HRAC	Nom	Casa comercial	Dosi/ha,	l o kg	Sensibilitat de les Males Herbes												
							<i>Echinochloa crus-galli</i>	<i>Digitaria spp</i>	<i>Setaria spp</i>	<i>Sorghum halepense</i>	Gramínies anuals	<i>Portulaca oleracea</i>	<i>Chenopodium album</i>	<i>Xanthium</i>	<i>Datura stramonium</i>	Amaranthus spp	Dicotiledònies anuals	<i>Abutilon theophrasti</i>	<i>Cyperus rotundus</i>
HERBICIDES A APLICAR EN PREEMERGÈNCIA DEL CULTIU (*Alguns també en postemergència precoç)																			
Aclonifen 50% + Isoxaflutol 7,5%	SC	E+F2	LAGON	BAYER	1 l/ha	S		MS	I	S	S	S	S	S	S	I			
Dimetenamida-p 21,25% + Pendimetalina 25%	EC	K3+K1	WING-P	BASF	4l/ha	S	S	S	I	S	S	MS	I	MS	S	I			
Dimetenamida-p 72%	EC	K3	SPECTRUM	BASF	1-1,4 l/ha	S	S	S	I	S	I	MI	I	MI	S	I			
Imazamox 1,67% + Pendimetalina 25% * (Panis clearfield)	EC	B+K1	MUTUAL	BASF	3-4 l/ha	S	S	S	I	S	I			S	S				
Isoxaflutol 24%	SC	F2	SPADE FLEXX	BAYER	0,2-0,4 l/ha	MS	MI	MS	I	MS		S	MS		S	I			
Isoxaflutol 75%	WG	F2	SPADE	BAYER	70-135 g/ha	MS	MI	MS	I	MS		S	MS		S	I			
Linuron 45%	SC	C2	DIVERSOS NOMS	DIVERSES MARQUES	1-3 l/ha	S	MS	S	I	S	S	S	S		S	I			
Linuron 50%	WP	C2	DIVERSOS NOMS	DIVERSES MARQUES	1-3 kg/ha	S	MS	S	I	S	S	S	S		S	I			
Mesotriona 4% + S-Metolaclo 40% *	SE	F2+K3	CAMIX	SYNGENTA AGRO	3 - 3,75 l/ha	S		S	I	S	S		S	S	S				
Pendimetalina 33%	EC	K1	DIVERSOS NOMS	DIVERSES MARQUES	4-6 l/ha	S	S	S	I	S	S	MS	I	MS	MS	I			
Pendimetalina 36,5%	CS	K1	MOST MICRO HL	SIPCAM INAGRA SA	2-3 l/ha	S	S	S	I	S	S	MS	I	MS	MS	I			
Pendimetalina 40%	SC	K1	DIVERSOS NOMS	DIVERSES MARQUES	3-4 l/ha	S	S	S	I	S	S	MS	I	MS	MS	I			
Pendimetalina 45,5%	EC	K1	STOMP AQUA	BASF	2,5-3 l/ha	S	S	S	I	S	S	MS	I	MS	MS	I			
Petoxamida 60% *	EC	K3	SUCCESSOR 600	CHEMINOVA	2 l/ha	MS	S	S	I	S		S		S	S	I			
S-Metolaclo 31,25%+Terbutilazina 18,75% *	SC	K3+C1	PRIMEXTRA LIQ. GOLD	SYNGENTA AGRO	3-4 l/ha	S		S	I	S	S	S	MS		S	I			
S-Metolaclo 96% *	EC	K3	DUAL GOLD	SYNGENTA AGRO	0,5-2 l/ha	S	S	S	I	S	S	MI	I		MI	I			
MÈTODES MECÀNICS DE CONTROL																			
Treball del sòl						S	S	S	MS	S	S	S	S	S	S	MS	MS		
Cultivador						S	S	S	I	S	S	S	S	S	S	I	I		
Grada de pues						I	I	I	I	I	S	S	S	S	S	MS	I		
La sensibilitat de les males herbes s'indica de forma orientativa, doncs depèn del moment d'aplicació, de les dosis d'herbicida utilitzades o de la foma de realitzar el control mecànic, etc.																			
S sensible, I insensible, MI Mitjanament insensible, MS Mitjanament sensible																			