



## No apliqueu purins després de segar

Per un aprofitament òptim dels nutrients de les dejeccions ramaderes, aquestes s'han d'aplicar com més a prop de la sembra del cultiu es pugui o en cobertura. A més, en zones vulnerables, no està permès aplicar aquests productes abans de 2-2,5 mesos (segons el tipus de dejeccions) de la sembra del cultiu.

Per un aprofitament màxim dels nutrients es recomana aportar les dejeccions ramaderes poc temps (2-15 dies) abans de la sembra i/o, en el cas de dejeccions líquides, en cobertura, prop del període de màximes extraccions dels cultius (vegeu més informació, entre altres, en aquest [article](#) del [Butlletí núm. 12](#) de gener de 2017 i en aquest altre [article](#) del Butlletí núm. 8 de setembre de 2016 ). Aplicar dejeccions ramaderes, principalment purins, sobre el rostoll i/o palla del cereal després de la sega no és una pràctica recomanable si es vol aprofitar de forma òptima els nutrients que contenen les dejeccions.



La normativa estableix que, en Zones vulnerables a la contaminació per nitrats (vegeu en aquest [mapa](#) quines són) l'aplicació al sòl de dejeccions es pot realitzar, quan no hi ha cultiu al terreny, dins dels:

- dos mesos anteriors a la sembra del cultiu, per les dejeccions líquides
- dos mesos i mig anteriors a la sembra del cultiu, per les dejeccions sòlides.

Podeu trobar més informació sobre aquest tema en l'apartat 04 de la [Fitxa Tècnica núm. 2](#) de juliol de 2013 de la [Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes](#).

Per tant, sí que es poden aplicar dejeccions en aquests moments si:

- Es sembrarà en breu un cultiu d'estiu (sorgo, blat de moro,...). Vegeu aquest [article](#) (Butlletí núm. 4; maig-16)
- El proper cultiu s'ha de sembrar a finals d'agost o inicis de setembre (p.ex.: raigràs, colza). *Encara que normativament, en aquests casos, ja se'n podrien aplicar, es recomana planificar les aportacions de dejeccions en moments més propers a la sembra del cultiu.*

Recordeu que cal distribuir les dejeccions uniformement en la parcel·la i a la dosi correcta. Per aquesta raó es recomana la utilització d'equips de mànegues o similars per les aplicacions de purins i altres dejeccions líquides. Vegeu aquest [vídeo](#), aquest [article](#) (Butlletí núm. 23; gener-2018) i aquest altre [article](#) (Butlletí núm. 27; maig-18).

